


## 1. Zone cible

Ce modèle agroécosystémique vise à produire les aliments habituellement consommés et cultivés sous un climat semi-aride chaud au sahel (Mali, Burkina Faso, Niger, nord du Nigeria et dans une moindre mesure Tchad, Sénégal et Gambie). Le modèle est adapté à la production sous un climat chaud semi-aride. Il est idéal pour les zones de savane sèche, néanmoins peut également s'utiliser dans les zones de semi-désert, si un accès à l'eau est possible. Il est adapté pour des surfaces allant de 1 à 5 hectares, idéalement pour 2 hectares, ce qui correspond à la surface moyenne des petits producteurs de la région cible.



## 2. Description de l'agroécosystème

L'agroécosystème de 2 hectares est composé de quatre zones principales distinctes : une zone de cultures maraîchères et tubercules (I), une zone de grandes cultures (II), une zone de pâturage avec un enclos pour les animaux (III), une zone d'agroforesterie (IV), ainsi qu'une zone bâtie (V). L'agroécosystème entier est entouré d'une haie vive productive (VI), qui sépare également les différentes zones.



**Zone I : cultures maraichères et tubercules : 4000 m<sup>2</sup>, 8 parcelles de 500 m<sup>2</sup> + séparation de 500 m<sup>2</sup>**





Figure 1 : Rotation de 8 ans dans la zone I. Les différentes couleurs indiquent les différentes familles de légumes

La zone I est séparée en 8 champs de 500 m<sup>2</sup>. Autour de la zone, ainsi qu'au milieu de la zone (séparation des champs dans la longueur), une ceinture Papayer-Pois Cajan permet de limiter l'érosion, fournit une ombre, des fruits et du fourrage. Les champs de la zone I sont irrigués et cultivés en permanence. Des cultures exigeantes ou moins exigeantes, ainsi que des légumes de différentes familles sont cultivés en alternance pour limiter les risques d'épuisement du sol et de forte pression de ravageurs et maladies. Un engrais vert (mucuna) au sein de la rotation permet de régénérer le sol. Une biofumigation (crotalaria) permet de stériliser le sol.

La rotation dans la zone I dure 8 ans, débutant sur chacun des 8 champs avec une culture différente, puis en continuant chronologiquement (voir schéma ci-dessous, extrapoler à 8 champs et 8 années).



**Zone II : grandes cultures** : 7'000 m<sup>2</sup>, 6 parcelles de 1000 m<sup>2</sup> + séparations de 1000 m<sup>2</sup>

La zone II permet la production de denrées calorifiques en grandes quantités. Il s'agit de grandes cultures peu sensibles (ravageurs, maladies, sécheresse) nécessitant peu d'entretien et d'eau. Ces cultures sont cultivées en saison pluvieuse uniquement et ne sont pas irriguées. La zone II est séparée en 6 champs de 2836 m<sup>2</sup>. Les champs sont séparés par des double-rangées de brachiaria, qui permettent de limiter l'érosion, de produire du fourrage et de combattre les ravageurs des céréales (voir contrôle des ravageurs). Une rangée de brachiaria est également plantée sur les côtés externes des champs (au pied des haies externes). Il est en effet nécessaire que les champs soient entourés de brachiaria pour l'efficacité du contrôle des ravageurs avec le système push-pull.

Cultures 1		Cultures 2		Cultures 3		Cultures 4		Cultures 5		Cultures 6	
06-09	10-05	06-09	10-05	06-09	10-05	06-09	10-05	06-09	10-05	06-09	10-05
Maïs		Sorgo		Patate douce		Maïs		Bissap		Biofum	Niébé
Desmodium		Arachide				Desmodium					

Figure 2 : Rotation dans la zone II. Les couleurs indiquent les différentes familles de plantes.

Une rotation sur 6 ans est installée, en commençant sur chacun des 6 champs avec une culture différente (même principe qu'en zone I). Des céréales et des légumineuses à grains sont majoritairement cultivées. Des engrais verts (niébé, desmodium) permettent de régénérer le sol et la biofumigation (*Crotalaria*) de le stériliser. Pour limiter les risques de ravageurs et de maladies de ces deux familles de plantes, des cultures différentes sont cultivées tous les 3 ans (bissap et patate douce). En zone II, un travail minimal du sol est réalisé. Cette zone est cultivée en semis direct avec couverture végétale permanente (voir chapitre travail du sol), sauf lors de la plantation de la patate douce. Le sol n'est jamais labouré et est toujours recouvert : soit par une culture vivante, soit par un paillage de la culture précédente.

**Zone de pâturage pour animaux (III)** : 5'800 m<sup>2</sup> : Surface servant de pâturage pour les animaux, séparée en 4 parcelles clôturées (1'250 m<sup>2</sup>) et séparée par des haies de pois cajan (300 m<sup>2</sup>). Les animaux pâturent sur une parcelle pendant que les autres parcelles sont protégées, de manière à ce que la végétation repousse. L'enclos des animaux (500 m<sup>2</sup>) contient une étable (100 m<sup>2</sup>) et une zone de sortie permanente autour de l'étable (400 m<sup>2</sup>). Des arbres sont plantés dans la zone d'exercice pour fournir de l'ombre aux animaux.

**Zone d'agroforesterie (IV)** : 1'000 m<sup>2</sup> : Dans cette zone, on cultive des arbres de différentes tailles pour optimiser l'espace et l'ombrage. Des arbres fourragers sont plantés pour nourrir les animaux, ainsi que des arbres fruitiers et des arbres dont on utilisera le bois. Au début, les arbres doivent être protégés des animaux. Une fois les arbres installés, on laisse les animaux pâturer à l'ombre des arbres et se nourrir sur ceux-ci.

**Zone bâtie (V)** : 1000 m<sup>2</sup> : Cabane pour stockage outils et semences, forage et château d'eau (10'000 L), pépinière, cabanon WC. La pépinière est utilisée pour la préparation des plantons de légumes et des plants de fruitiers. Quelques arbres sont plantés sur cette surface pour fournir de l'ombre.

**Haie vive productive (VI)** : 1200 m<sup>2</sup> : Les haies servent à protéger les cultures du vent, des ravageurs et maladies. Elles sont plantées tout autour de la parcelle sur 1.5 m de large. Elles séparent également les zones I, II et III. Elles limitent l'érosion du sol et contribuent à retenir l'eau dans les cultures tout en puisant l'eau s'infiltrant dans des horizons plus profonds du sol. Elles sont constituées principalement d'arbres fourragers légumineux et de quelques fruitiers.

### 3. Gestion de l'eau

**Forage et irrigation :** Un accès à de l'eau en quantité est important pour la productivité du système. Un forage avec pompe solaire et château d'eau sont donc construits dans la zone bâtie. Le château d'eau doit contenir au minimum 10'000 L avec une pompe d'un débit de 5'000 L/h, afin de garantir l'approvisionnement en eau de la zone I en saison sèche.. Les cultures de la zone II, ne sont arrosées qu'en cas de nécessité. Les autres cultures des zones II, III, IV et VI ne sont jamais arrosées une fois le système installé. Les jeunes plants de ces zones doivent par contre être arrosés les 2 premières années.

**Récupération de l'eau ruisselante :** Des drains sont aménagés pour empêcher l'eau ruisselante d'emporter le sol de la parcelle. L'eau ruisselante est collectée grâce à ces drains dans une piscine, où les animaux peuvent s'abreuver, les canards nager et des poissons être élevés.

**Culture dans trous zaïs :** Le maïs et le sorgo sont cultivés dans des trous zaïs. Des trous de 10-20 cm de profondeur et 20-30 cm de largeur sont creusés et remplis d'un mélange fumier-compost-sol et recouverts de paillage. La terre restante forme des billons autour des trous pour que l'eau se concentre dans les trous. Les céréales sont ensuite semées en poquet dans les trous où les nutriments et l'eau sont concentrés. Les trous zaï sont disposés en quinconce.

**Culture sur billons cloisonnés :** Les tubercules sont plantés en ligne dans des billons de 30 à 40 cm de hauteur. Des billons sont érigés perpendiculairement pour relier les billons entre eux chaque 3 m. Ces billons servent à retenir l'eau dans les cultures, ils doivent être de taille plus petite (20 respectivement 10 cm), afin d'éviter que l'eau ne déborde sur les billons principaux. L'eau est ainsi retenue aux pieds des billons et peut être puisée par les cultures se trouvant soit sur ou soit au pied du billon. Les cultures produisant sous terre sont systématiquement plantées sur les billons pour éviter le pourrissement des organes souterrains en cas de stagnation.

**Cordons pierreux :** Les parcelles, les zones ou l'agroécosystème sont délimitées par des cordons pierreux qui retiennent l'eau ruisselante. Un sillon de 15 cm de profondeur et 15 cm de large est creusé, puis rempli de pierres à une hauteur de 15 cm.

**Variétés résistantes à la sécheresse :** Il est important de choisir des variétés résistantes à la sécheresse, soit en utilisant des variétés améliorées, soit en utilisant des variétés locales parfaitement adaptées au climat (par exemple Nyù pour l'igname dans la région de Yako au Burkina Faso).

## 4. Travail du sol

Le retournement intensif du sol, de même que l'exposition du sol sans couverture, sont des pratiques néfastes responsables d'une dégradation de la fertilité du sol à travers une forte érosion et décomposition de la matière organique. Dès lors, le semis direct avec couverture végétale permanente est conseillé. En semis direct, le sol n'est travaillé que superficiellement et localement à l'endroit où sera planté la graine ou le planton. A noter que ceci nécessite un sol sans croûte durcie. Une couverture permanente du sol, soit par une culture soit par un paillage déposé sur le sol, est donc essentielle pour prévenir la création de la croûte, tout en protégeant le sol de l'érosion.

En première année, la parcelle est défrichée à la machette, puis le sol labouré superficiellement. Une partie de la biomasse récoltée est déposée sur le sol pour le recouvrir, l'excédent sert de nourriture aux animaux. Ce procédé ne sera pas réalisé les années suivantes dans la zone de grandes cultures. En effet, la culture semée pendant la saison sèche sera fauchée au plus tard 1 mois avant le semis, si elle n'est pas morte durant la sécheresse. La biomasse est laissée sur le sol (les excédents nourrissent les animaux) et le semis se fait sous la couverture en ouvrant le sol localement à l'aide de daba ou de machettes. Dans la zone de maraichage, un retournement du sol chaque saison est nécessaire mais sa profondeur est limitée.

Le paillage sous lequel sont semées les cultures sert également à mieux conserver l'humidité et donc à optimiser l'utilisation d'eau douce. Le paillage est à privilégier sur les cultures à faible couverture et/ou impliquant une forte perturbation du sol, ainsi que sur les cultures gourmandes en eau (légumes). Le paillage est déposé entre les billons, afin de limiter l'évaporation de l'eau accumulée. Sur les cultures d'igname, le paillage est déposé sur le billon. Les excédents de paillage sont toujours utilisés comme fourrage. Le paillage de la culture précédente est systématiquement utilisé sur la culture suivante, après avoir prélevé la quantité nécessaire pour le fourrage ou la litière (paille de riz) des animaux.

## 5. Gestion des nutriments




Figure 3: Cycle des nutriments dans l'agroécosystème

**Gestion des excréments humains :** L'urine et les fèces sont séparées dès le début, soit à l'aide de toilettes sèches à séparation d'urines, soit à l'aide de 2 toilettes séparées. Deux fosses à fèces sont nécessaires. Les fèces doivent être préservées de tout apport d'eau et des cendres doivent être appliquées après chaque utilisation. Quand une fosse est pleine, les fèces doivent y être séchées pour une durée minimale d'une année. Elles peuvent ensuite être appliquées dans la zone IV. Les urines sont collectées et stockées dans des jerrycans pendant 3 mois. Elles sont ensuite mélangées au compost pour améliorer sa teneur en nutriments.

**Gestion des excréments animaux :** Les animaux se trouvent soit dans les différentes zones de culture (I, II, principalement III, IV) soit dans leur zone d'exercice permanente suivant la saison et leur utilité dans les cultures. Quand ils se trouvent dans les cultures, leurs excréments sont répartis sur la parcelle si besoin est, mais ne sont pas ramassés. Dans leur étable et la zone d'exercice, un système de collecte est organisé. Le fumier est ensuite stocké dans une fosse en béton/briques étanche à l'abri de la pluie et recouverte d'une bâche pour limiter les contacts avec l'air, de façon à éviter les pertes de nutriments par lessivage ou volatilisation.

**Gestion des déchets organiques :** Les déchets organiques non comestibles, ni pour l'homme, ni pour l'animal, sont compostés avant d'être appliqué comme fumure.

**Fertilisation:** Le compost et l'urine doivent être mélangés quelques semaines avant l'application. Ce mélange, ainsi que le fumier de ruminant sont amendés pendant la préparation du sol avant le semis en l'incorporant dans le sol pour limiter la volatilisation. Le fumier de poulet est appliqué à l'épiaison des céréales et à l'initiation des tubercules/racines/bulbes. Pour les autres légumes, le fumier de poulet est appliqué au pied des cultures en 3 amendements: 30% à la floraison, 50% à la fructification et 30% après la première récolte. Les détails pour la fertilisation de chaque culture spécifique sont donnés sur les tableaux (demande des cultures en nutriments + conseils de fertilisation). Les conseils de fertilisation sont donnés en kg/ha pour l'ensemble des parcelles, ainsi qu'en g/m linéaire pour les légumes. Pour produire suffisamment de fumier pour l'ensemble de la récolte, on estime qu'il faut 13 moutons, 15 chèvres, 4 bœufs, 10 canards et 50 poules de races mixtes. On estime que 80% des ruminants respectivement 90% des excréments de volaille peuvent être récoltés et utilisés. Les quantités restantes sont laissées sur le pâturage pour fertiliser ces parcelles. Les tableaux suivants résumant les besoins annuels en fumier des différentes zones, ainsi que le nombre d'animaux nécessaires et la quantité de fumier qu'ils produisent. Le compost et l'urine sont utilisés comme fertilisation supplémentaire en plus des quantités nécessaires de fumier.

Tableau 1 : Nombre d'animaux par type, et quantité de fumure récoltable par type d'animaux.

	Type d'animal	Têtes	Fumure [kg]
Volailles	Poules	53	1797
	Poulets	0	0
	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>1797</b>
Ruminants	Chèvres	15	1969
	Moutons	13	1969
	Bœufs	4	2626
	<b>Total</b>	<b>32</b>	<b>6564</b>

Tableau 2 : Quantité de fumure nécessaire pour les différentes zones de l'agroécosystème, en kg et en t/ha.

Besoin en fumure [kg]	I	II	IV	Total	
Fumier de ruminants		4 062	2 456	47	<b>6 564</b>
Fiente de volailles		901	850	47	<b>1 797</b>
Besoin en fumure [t/ha]	I	II	IV		
Fumier de ruminants		10.2	3.5	0.5	<b>3.3</b>
Fiente de volailles		2.3	1.2	0.5	<b>0.9</b>

## 6. Contrôle des ravageurs et maladies

**Haute Biodiversité** : Le contrôle des maladies et des ravageurs dans cet agroécosystème se base sur une haute biodiversité, tant par un nombre maximum de variétés différentes de la même espèce, que par un nombre maximum d'espèces. Ceci devrait permettre la limitation de l'expansion des ravageurs par une discontinuité des ressources et par des effets répulsifs dans certains cas (voir ci-dessous). Une haute biodiversité favorise la présence d'insectes pollinisateurs ou auxiliaires (prédateurs ou parasitoïdes) qui se nourrissent des ravageurs et limitent de ce fait leurs populations. Cette approche diversifiée limite également les risques de récolte catastrophique, une mauvaise récolte d'une espèce pouvant être compensée par une bonne récolte d'une autre.

**Bonne nutrition des plantes** : Le sol est maintenu fertile avec des apports d'engrais organiques (voir gestion des nutriments), ce qui soutient la bonne santé des cultures et leur résistance aux ravageurs et maladies.

**Rotation des cultures**: Des cultures de différentes familles botaniques sont cultivées chaque année pour éviter la transmission de maladies et de ravageurs dans le temps.

**Choix des semences** : Dans l'idéal, des semences de variétés locales, connues pour résister aux maladies et aux ravageurs, sont utilisées. Si les variétés locales sont susceptibles aux maladies, des variétés résistantes provenant d'institut de recherche agronomique peuvent être utilisées. Les semences hybrides ne sont pas adéquates, car le système aspirant à être autonome, une partie de la production doit pouvoir être utilisée comme semence la deuxième année.

**Traitement des semences** : Tout d'abord, les semences tubercules doivent être choisies parmi des gros tubercules sans signe de pourriture, dégâts d'insecte ou nématodes. Les tubercules doivent être stockés à l'ombre et en hauteur (pas de contact avec le sol). Ensuite, les pièces de tubercules d'igname, ainsi que les boutures de patate douce sont traitées avec de la cendre. 150 g de cendres sont mélangées avec 8 L d'eau dans un seau, les tubercules et boutures sont alors trempés durant 10 minutes, puis séchés à l'ombre aérée.

**Hygiène** : Les fruits tombés au sol sont ramassés et compostés. Les plantes malades sont enlevées avant que la maladie ne se propage et sont rapidement brûlées.

**Volailles** : Les canards pâturent dans les parcelles, avant maturité des graines, pour combattre les ravageurs.

**Plantes répulsives** : Des plantes, sécrétant des molécules répulsives contre les ravageurs, sont utilisées (gingembre, piment, oignon, ail), en particulier en combinaison avec des plantes sensibles aux ravageurs, par exemple oignon comme compagnon de la carotte ou tagète en association avec les solanacées.

**Plantes attractives et refuges** : Des plantes à fleurs (hibiscus, gombo, amarante, tagète) sont utilisées pour attirer un maximum d'insectes différents dont des prédateurs des ravageurs de cultures. Des refuges (cordons pierreux, haies, paillage, haute biodiversité) favorisent également les populations d'auxiliaires.

**Contrôle du striga dans les céréales :** Le contrôle du striga se base tout d'abord sur un maintien de la fertilité du sol, limitant l'installation du striga dans le système. Des légumineuses sont toujours cultivées en association avec les céréales et devraient empêcher l'installation de l'herbe parasite. En cas d'infection des céréales par le striga, il faut remplacer les légumineuses à grains en association avec les céréales par des espèces *Desmodium*, qui provoquent une germination suicide du striga et l'empêche de s'installer sur les racines du maïs.

**Contrôle de la pyrale et de la légionnaire d'automne dans les céréales :** Le contrôle de la pyrale et de la chenille légionnaire d'automne dans les céréales (maïs, sorgo, mil, fonio) s'effectue grâce au système push-pull. Un sous-semis de *Desmodium* repousse les ravageurs et une rangée d'herbe de *Brachiaria* plantée autour du champ l'attire. Pour cette raison, les séparations des champs dans la zone II sont des rangées de *brachiaria*. En cas d'absence de ravageur, le *Desmodium* peut être remplacé par une légumineuse à grains. En cas d'infection, toutes les légumineuses en association avec les céréales doivent être remplacées par le *Desmodium*.

**Contrôle des termites :** Les termitières visibles sur le champ sont détruites mécaniquement. La reine est localisée et tuée. La terre amassée par les termites est riche en argile et peut être répartie sur les parcelles pour en améliorer la fertilité. Les plantes doivent être maintenues en bonne santé par une bonne fertilité du sol. Le stress hydrique sur les cultures sensibles (maïs, arachide) doit être évité. Les termites préfèrent les cultures sèches. En cas de forte présence de termites, le sorgo et le mil doivent être préférés au maïs, et le pois bambara et le niébé à l'arachide. Un paillage doit être appliqué sur les cultures infectées de termites. Ce paillage va fournir une nourriture alternative aux insectes et limiter les dégâts sur les cultures. Toutefois, il peut aussi soutenir le développement des termites et empirer l'infection. L'évolution de la population des insectes doit donc être observée régulièrement et la pratique de paillage réduite si elle se révèle contre-productive. Les arbres doivent être taillés soigneusement (coupure droite et sèche), les blessures sur les arbres doivent être soignées pour éviter l'entrée des termites.

**Contrôle des nématodes et des maladies terricoles :** Au sein de la rotation, un semis de radis est effectué. La décomposition des racines du radis va tuer certains nématodes et maladies terricoles par un processus de biofumigation.

**Contrôle des virus dans les plantes tubercules :** La sélection des moyens de reproduction se fait parmi les plantes ne montrant aucun signe d'infection virale. Si les variétés locales sont lourdement infectées de virus, des variétés issues d'institut de recherche agronomique doivent être utilisées. Une inspection des signes de virus doit s'effectuer une fois par semaine pendant les 2 premiers mois de culture. Les plantes d'igname et de pomme de terre montrant des signes d'infection virale doivent être immédiatement tuées et brûlées. Elles peuvent être remplacées par d'autres cultures. Si des signes d'infection virale apparaissent plus tardivement, la plante peut être conservée mais doit être marquée convenablement pour ne pas l'utiliser et éviter une propagation d'infection virale la saison suivante.

**Contrôle des oiseaux et des mammifères :** Des pièges pour rongeurs (ex. souricière) sont installés aux abords des parcelles. A l'épiaison des graminées, des épouvantails sont installés pour éloigner les oiseaux. Une vigilance accrue est nécessaire à cette période et les graines doivent être récoltées le plus rapidement possible.

### Traitement en cas d'infection

**Pièges pour insecte :** En cas d'épidémies de ravageurs, des pièges à insectes sont installés autour des cultures infectées. Il peut s'agir soit de bouteilles en PET contenant une boisson sucrée, soit de pièges collants à l'aide de papaye ou banane écrasée.

**Traitements :** En cas de dégâts de ravageurs, on traite avec des macérations naturelles 1 x par semaine. Utiliser 3 fois un traitement, puis changer de traitement. Si le traitement n'est pas efficace, essayer directement un autre traitement.

*Macération ail :* Piler des gousses d'ail. Mélanger 2 cuillères à soupe de poudre d'ail avec 10 L d'eau. Laisser macérer 12 h. Mélanger 1 L de macération d'ail avec 2 L d'eau savonneuse (3 bouchons de savon + 4 L d'eau). Pulvériser 1 L sur 10 m<sup>2</sup> de culture. Efficace contre pucerons, acariens et mouches.

*Macération piment :* Identique à l'ail en utilisant le piment broyé. Efficace contre insectes suceurs et piqueurs, chenilles, grillons et criquets.

*Macération tomate :* Broyer et laisser macérer 200 g de feuilles dans 1 L d'eau durant 12 h. Filtrer et ajouter 1 mL de savon. Pulvériser 3 L par m<sup>2</sup>. Efficace contre insectes et maladies fongiques.

*Macération papaye :* Piler 1 kg de feuilles de papaye et mélanger avec 10 L d'eau. Ajouter un peu d'argile, fermer le récipient en laissant une entrée d'air. Laisser fermenter 15 jours puis filtrer. Pulvériser 1 L par 10 m<sup>2</sup>. Efficace contre maladies fongiques (oïdium et rouille)

*Macération tagète :* Faire macérer les fleurs et feuilles de tagète. A utiliser principalement contre les mouches blanches, les noctuelles et les cicadelles.

*Macération de feuilles de neem :* 3 kg de feuilles de neem pilées + 10 L d'eau + 30 g de savon, laisser macérer 24h. Filtrer puis pulvériser sur les feuilles. Le résidu des feuilles est appliqué aux pieds des cultures comme engrais et nématicide.

*Huile de neem :* Broyer 2.5 kg de grains de neem. Laisser macérer 12h dans 10 L d'eau, puis filtrer. Mélanger avec 5 L d'eau savonneuse et pulvériser. A utiliser en cas d'échec des autres traitements.

*Poudre de neem :* Broyer écorces et graines de neems, mélanger avec de l'eau et laisser infuser 1 jour. Ajouter du savon puis appliquer 2 l par pied d'arbre ou par m<sup>2</sup>. A utiliser contre les ravageurs dans le sol comme les termites, particulièrement pour protéger les jeunes d'arbres et parfois les cultures.

*Lait :* A utiliser pour traiter l'oïdium sur les légumes. Mélange 50% lait / 50% eau pour traiter les plantes infectées, 20 % lait / 80 % eau pour traiter les plantes environnantes en préventif.

*Cocktail :* Il est également possible de combiner les différents ingrédients pour avoir un effet plus large. Par exemple, 1 kilo de chaque ingrédient ail gingembre piment feuilles de neem ou de papaye écrasée a macérer dans 20 l durant une semaine. Arroser ou pulvériser 1 l du produit dans 15 l d'eau.

## 7. Pratiques culturales

### 7.1. Zone I : cultures maraichères et tubercules.

#### Séparation des parcelles

La séparation entre les parcelles se fait avec une rangée de papayers-pois cajans. La ceinture entoure la zone, et la coupe en deux au milieu. Une double rangée est plantée au milieu, avec un chemin au centre pour circuler. La distance entre les arbres est de 1 m, en alternant les pois cajans et les papayers. Le pois cajan est semé directement (2 graines par poquet), alors que les papayers sont préparés en pépinière.

#### Pépinières

Les plants sont préparés dans une pépinière rustique, construite avec des piquets de 0.5 m – 1 m pour faire tenir des filets anti-insectes pour protéger les cultures. La taille des structures dépend de la taille des filets. Un cordon pierreux est construit autour de la structure pour empêcher l'entrée des rongeurs. Le semis se fait dans des lits préparés en mélangeant du sol (70%) avec du fumier (30%). Les pépinières sont installées dans la zone bâtie. Des plants sont constamment semés, élevés puis transplantés, de manière à ce que la production des différents légumes soit répartie sur une longue durée. Les semis directs et la transplantation se font au même moment. Les plants à préparer en pépinière doivent donc être initiés 2 à 4 semaines avant le début du champ.



#### 7.1.1. Sous dispositif I.I : cultures maraichères.

#### Travail du sol

Les parcelles de la zone I sont superficiellement labourées à la main chaque année (10 cm de profondeur). Pour la majorité des cultures, des planches surélevées de 10 à 20 cm de haut et 1 m de large sont créées. Les planches traversent toute la parcelle en longueur. Pour certaines cultures, le semis est réalisé directement en poquets ou en ligne. Le tableau 3 indique le type de préparation spécifique pour chaque culture. La fertilisation de base est appliquée sur les planches avant la plantation. Des engrais supplémentaires sont appliqués aux pieds des cultures. Pendant la saison sèche, les légumes sont transplantés dans de petits trous zai creusés dans les lits surélevés. Le fumier et l'eau sont ainsi concentrés dans ces trous.

## Fertilisation

Tableau 3 : Quantité de fumier à appliquer pour chaque culture de la zone I. La quantité est donnée en kg / parcelle et en g / m-lin sur la ligne. La première valeur est utilisée pour connaître la quantité nécessaire pour la parcelle, la seconde est utilisée lors de l'application. Les cultures non présentées ici ne sont pas fertilisées spécifiquement.

Culture	Espèce	Apport fertilisant par champ [kg]				Apport fertilisant par ligne [g/m-lin]				Total
		Fumier ruminar	Fiente de Volailles	Fumier rumin	Fiente de Volailles					
		Semis	Floraison	Fructificatio	1ère récolt	Semis	Floraison	Fructificati	1ère récol	
1.3, 4.1	Betterave	98	0	0	0	170	0	0	0	170
1.3, 4.1	Carotte	90	0	0	0	156	0	0	0	156
1.3, 4.1	Oignon	109	0	0	0	190	0	0	0	190
1.4, 4.2	Maïs	408	0	74	0	408	0	74	0	482
1.4, 4.2	Melon	64	10	10	0	255	39	39	0	334
2.1	Chou	94	29	0	0	299	92	0	0	392
2.1	Concombre, courge	128	20	20	0	255	39	39	0	334
2.1	Laitue	69	0	0	0	167	0	0	0	167
3.1	Tomate	166	36	60	24	237	51	85	34	408
5.1	Courge	204	32	32	0	204	32	32	0	267
6.2	Pomme de terre	394	0	122	41	316	0	97	32	445
7.1	Aubergine	81	17	29	12	231	50	83	33	397
7.1	Poivron	73	16	26	10	208	45	75	30	357
	<b>Total besoin</b>	<b>4062</b>	<b>179</b>	<b>636</b>	<b>87</b>					

Informations sur les cultures : durée, préparation du sol, espacement, quantité de semis

Tableau 4 : Informations sur les cultures pour les différentes cultures de la sous-zone I.I. Les cultures colorées ensemble sont associées. La préparation du sol est indiquée comme suit : LS = Lits surélevés, Bi (x,y) = Billons (Distance entre les billons, hauteur), Bu (x,y) = Buttes, aucun = semis/transplantation effectué dans le champ tel qu'il est après la culture précédente. Le type de semis est indiqué comme suit : P(x,y) = Poquet (graines par poquet, nombre de plants à garder après démarriage), TP = Transplantation, L = Semis en ligne, V = Semis à la volée

Code	Espèce Nom	Famille	Pause rot.	Parcelle [m2]		Durée [semaines]			Sarclage [SAP]	Prep Sol	Semis Type	Prof [cm]	[kg/ha]	Plantons		Espacement [cm]		Densité [plante/ha]
				Tot.	Ut.	Pep.	Non-prod	Prod						par par. [g]	Nb	Sur ligne	Entre ligne	
1.1	Gombo	Malvaceae	4/7	500	500	0	4-6	4-6	3	Aucun	P(2)	2	4	200	0	30	50	66 667
1.2, 5.2	Crotalaria	Fabaceae		500	500	0	6-8	0	0	Aucun	V	0	4	200	0	-	-	-
1.3, 4.1, 6.3	Carrote	Apiaceae	4/7	500	350	0	10	3-4	Ch. 2	LS	L	0.5	2	70	0	3	60	555 556
1.3, 4.1, 6.3	Oignon	Alliaceae	5/7	500	350	4	10-12	2	Ch. 2	LS	TP	0.5	2	70	5 833	10	60	166 667
1.3, 4.1, 6.3	Betterave	Chenopodiaceae	4/7	500	350	3	10-12	2	Ch. 2	LS	TP	1	6	210	3 889	15	60	111 111
1.4, 4.2, 6.1	Maïs	Poaceae	3/5	500	500	0	9-13	1	3,5,7	Aucun	P(2-1)	3-4	25	1250	0	40	100	25 000
1.4, 4.2, 6.1	Haricot	Fabaceae	3/4	500	500	0	4-5	3-4	3,5,7	Aucun	P(1-1)	1-2	7	350	0	20	100	50 000
1.4, 4.2, 6.1	Pastèque, Melon	Cucurbitaceae	5/7	500	500	2	4-5	2-3	3,5,7	Aucun	TP	1-2	1.2	60	200	250	100	4 000
2.1	Laitue	Asteraceae	4/7	250	175	3	6	2	Ch. 2	LS	TP	0.5	0.3	5	1 458	20	60	83 333
2.1	Choux	Brassicaceae	4/7	250	175	3	10	2	Ch. 2	LS	TP	1	0.3	5	729	40	60	41 667
2.1	Concombre	Cucurbitaceae	5/7	125	88	3	4-5	4-5	Ch. 2	LS	TP	1-2	0.4	4	547	40	40	62 500
2.1	Courgette	Cucurbitaceae	5/7	125	88	3	4-5	4-5	Ch. 2	LS	TP	1-2	0.4	4	243	60	60	27 778
3.1	Tomate	Solanaceae	4/7	500	350	3	8	6	Ch. 2	LS	TP	1-2	0.25	9	972	60	60	27 778
3.1	Herbes arom.	Differentes		500	350	3	4	2-3	Ch. 2	LS	TP	0.5-1	0.25	9	486	60	120	13 889
4.3, 8.1	Mucuna	Fabaceae		500	500	0	10	2	3,5,7	Aucun	P(1-1)	2	20	1000	0	30	30	111 111
5.1	Igname	Dioscir.	3/4	500	500	0	28	3-4	3,5,12,18	Bi(100,40)	Tu	30	600	30 000	2 000	25	100	40 000
5.1	Courge	Cucurbit.	5/7	500	500	2	4-5	2-3	3,5	Aucun	TP	1-2	1	60	500	100	100	10 000
6.2	Pomme de terre	Solan.	4/7	500	500	0	5-7	2	3,5,7	Bi(40,30)	P(1-1)	10	1 500	75 000	0	30	40	83 333
7.1	Poivron	Solanaceae	4/7	500	350	3	8	6	Ch. 2	LS	TP	1-2	0.25	9	700	50	100	20 000
7.1	Aubergine	Solanaceae	4/7	500	350	3	8	6	Ch. 2	LS	TP	1-2	0.25	9	700	50	100	20 000
7.1	Tagète	Asteraceae	4/7	500	350	3	4	2-3	Ch. 2	LS	P(2-1)	0.5-1	0.4	14	0	100	50	20 000


### Schéma de plantation

Tous les schémas d'association des cultures sont présentés ici. Lorsqu'une seule culture est cultivée, on suppose que les informations sur l'espace sont suffisantes.


#### Cultures 1.2, 5.3 : Crotalaria

Le crotalaria est semé à la volée. Juste avant la floraison (après 2 mois), il est coupé et directement incorporé dans le sol (max 5 minutes) afin de permettre la biofumigation (tuer les maladies transmises par le sol, les nématodes et les ravageurs).

#### Culture 1.3, 4.1, 6.3 : Carotte, Oignon et Betterave




#### Cultures 1.4, 4.2, 6.1 : Maïs, Haricot et Courge




#### Cultures 2.1 : Choux, Laitue, Courgette et Concombre

Alternez les planches de concombre, courgette et choux-laitue.




#### Cultures 3.1 : Tomate et herbes aromatiques




#### Cultures 5.1 : Igname et courge

Billons pour les ignames de 40 cm de hauteur. Les billons sont recouverts de paille. Des tuteurs sont construits avec des bois.



#### Cultures 7.1 : Poivron, Aubergine et Tagète



## 7.2. Zone II : zone de grandes cultures

### Installation du brachiaria

Comme expliqué dans le chapitre « contrôle des ravageurs et maladies », le brachiaria sert à attirer les ravageurs des céréales en dehors de la culture principale. Une double rangée est semée entre les parcelles, une simple rangée aux pieds des haies sur les côtés des parcelles. La distance sur la ligne est de 40 cm. Semer soit plusieurs graines soit une bouture par poquet. Les premières lignes de maïs ou de sorgo doivent commencer à 1 m au minimum du brachiaria.

### Préparation de la parcelle

Sauf la première année où toute la zone est labourée, le semis direct est pratiqué dans cette zone, comme expliqué dans le chapitre « Gestion du sol ». La zone doit rester recouverte de paille pendant la saison sèche. L'ameublissement du sol peut être effectué à l'aide de sous-soleuse ou de grelinette. Pour la culture de la patate douce, le sol est labouré pour pouvoir créer les billons.

### Fertilisation

Tableau 5 : Quantité de fumier à appliquer pour chaque culture de la zone II. La quantité est donnée en kg / parcelle et en t / ha. Les cultures non présentées ici ne sont pas fertilisées spécifiquement.

Culture		Apport fertilisant [t/ha]		Apport fertilisant par champ[kg]	
Code	Espèce	Fumier ruminant	Fiente de Volailles	Fumier ruminant	Fiente de Volailles
		Semis	Floraison/Epiaison	Semis	Floraison/Epiaison
1.1, 4.1	Maïs	7.1	2.2	715	221
2.1	Arachide	4.0	3.9	201	194
2.1	Sorgo	6.2	1.1	308	56
5.1	Bissap	5.2	1.6	517	160
	<b>Total besoin</b>	<b>3.5</b>	<b>1.2</b>	<b>2456</b>	<b>850</b>


### Crop duration, care, spacing and seeds

Tableau 6 : Informations sur les cultures pour les différentes cultures de la zone II. Les cultures colorées ensemble sont associées. La préparation du sol est indiquée comme suit : AS = Ameublissement du sol avec sous-soleuse ou grelinette. Le type de semis est indiqué comme suit : P(x,y) = Poquet (graines par poquet, nombre de plants après démarrage), Z(x,y) = Zaï (graines par zaï, nombre de plants après démarrage), L = Semis en ligne, V = Semis à la volée.


Code	Espèce	Famille	Pause Rot.	Durée culture [S]	Sarclage [SAP]	Prep Sol	Semis Type	Prof [cm]	Dens. [kg/ha]	par parc [kg]	Espacement[cm]		Densité [plante/ha]	Scheme/Note
											Sur l.	Entre l.		
1.1, 4.1	Maïs	Gram.	1/2	12-16	3,5,7	AS	Z(4-2)	3-4	30	3.0	75	75	35 556	Semer le desmodium entre les zaïs
1.1, 4.1	Desmodium	Leg.	3/5	96	3,5,7	AS	L	1-2	5	0.5	2	75	666 667	
2.1	Sorgo	Gram.	1/2	10-14	3,5,7	AS	Z(8-3)	0	20	2.0	75	75	53 333	Créer des billons autour des trous zaïs et y planter les arachides.
2.1	Arachide	Leg.	3/4	10-12	3,5,7	AS	Bi(75,20)	2-3	40	4.0	20	75	66 667	
3.1	Patate douce	Convov.		16-20	3,5	Aucun	Bi(75,40)			3 333 bout.	40	75	33 333	Relever les billons d'arachides pour les patates douces
5.1	Bissap	Malvaceae		16	3,5,9,13	AS	P(2-1)	2-3	5	0.5	40	80	31 250	
5.2	Crotalaria	Fabaceae		6-8	-	Aucun	V	0	4	0.4	-	-	-	Incorporer avant floraison pour biofumigation
6.1	Niébé	Leg.	3/4	8-10	3.5	AS	P(1-1)	2-3	22	2.2	15	50	133 333	

### Schéma de plantation

Culture 1.1, 4.1 : Maïs et Desmodium



Culture 2.1 Sorgo et Arachide



### 7.3. Zone III : pâturage des animaux

Il est estimé que le système peut soutenir environ 15 chèvres, 13 moutons, 4 boeufs, 50 poules et 10 canards. Cette estimation est très aléatoire et le nombre doit être adapté après les premières années. La surface pour les animaux (5'800 m<sup>2</sup>) est composée d'une étable de 100 m<sup>2</sup> avec autour une zone de sortie permanente de 400 m<sup>2</sup>, ainsi que d'une zone de pâturage de 5'300 m<sup>2</sup>. Une clôture barbelée est établie tout autour de la zone pour empêcher la divagation des animaux.

**Logement des animaux:** L'étable des ruminants doit fournir de l'ombre et une protection contre la pluie. Un mur de 1 m de hauteur suffit pour empêcher les animaux de sortir. Les mangeoires doivent être accessibles seulement par la tête des animaux, afin d'éviter de retrouver des excréments dans l'aliment. Un accès à l'eau potable est également essentiel. Le poulailler doit être fermé avec une clôture (entre le mur et le toit) pour éviter que les volailles ne sortent ou que des animaux sauvages n'entrent. Les poules pondeuses doivent avoir des perchoirs et des nichoirs. Le sol des étables doit être en béton pour permettre une bonne hygiène et une collecte facile du fumier. Les étables doivent donner accès à des pâturages permanents.

Tableau 7 : Espace nécessaire à l'intérieur et à l'extérieur pour chaque type d'animaux.

Animaux	Nombre	Espace int. / tête [m2]	Esp. ext. / tête [m2]	E. int. [m2]	E. ext. [m2]
Boeufs	4	2	4	8	16
Chèvres	15	1	2	15	30
Moutons	13	1	2	13	26
Poules	50	0.25	0.5	12.5	25
Canards et Oies	10	0.5	1	5	20

**Installation des animaux :** Au départ, 8 chevreaux (max 2 mâles), 8 agneaux (max 2 mâles) et 3 veaux (max 1 mâle) sont achetés. 20 jeunes poules pondeuses et 3 coqs sont achetés, ainsi que deux couples d'oies et de canards. Laisser les troupeaux se reproduire jusqu'à atteindre la population souhaitée, en prenant soin d'avoir assez de fourrage pour les soutenir.

**Production :** Le mâle est laissé toute la journée et la nuit dans le troupeau pour assurer une fécondation des femelles. Les animaux malades ou venant de mettre bas sont séparés du troupeau (dans un enclos d'isolement la nuit) pour éviter une fécondation au mauvais moment. Au début, certaines chèvres peuvent être séparées pour répartir la production d'agneaux et chevreaux sur l'année. Les petits animaux sont abattus à partir d'un poids de 30 kg suivant le besoin. Les animaux en mauvaise santé ou dépassant l'âge de 5 ans peuvent être remplacés par des jeunes plus robustes. Un échange des mâles avec des animaux d'un autre troupeau est nécessaire à ce moment.

Les poules sont utilisées pour la production d'œufs. Si leur production diminue, elles doivent être abattues et remplacées par des jeunes poules. Pour ceci, on laisse une poule couvrir ses œufs fécondés 2 fois par année. Les jeunes mâles sont mangés comme poulet quand ils atteignent leur taille adulte.

**Zone de pâturage :** Trois haies de pois cajan sont semées pour séparer la zone de pâturage en 4 champs de 1250 m<sup>2</sup>. Les haies sont placées de façon à ce que les animaux aient accès à l'étable depuis chaque champ. Le pois cajan est semé à une distance de 30 cm sur la ligne. Les animaux ne doivent pas être introduits avant que la haie soit suffisamment grande. Elle permettra d'empêcher la divagation entre les parcelles et fournira un fourrage supplémentaire.

Nous commençons par labourer les 4 champs, puis nous semons à la volée un mélange de fourrage. Le mélange doit être équilibré entre les légumineuses et les graminées. Le tableau 10 résume les espèces qui peuvent être semées avec les quantités correspondantes. Utilisez au minimum 5 graminées différentes et 5 légumineuses différentes dans le mélange.

Tableau 8 : Liste des plantes fourragères pouvant être utilisées pour la zone III. La quantité de semence en monoculture (seul) est donnée en kg / ha ou en boutures / ha, ainsi que la quantité nécessaire pour semer dans un mélange de 5 légumineuses et 5 graminées. La quantité pour la totalité de la zone III est également donnée. Si plus ou moins d'espèces que 5+5 sont utilisées, il faut adapter la quantité en fonction.

Famille	Nom commun	Nom latin	[Unité]	Seul [ /ha]	Mélange [ /ha]	Quantité nécessaire
Gram.		<i>Chloris gayana</i>	kg	8	1.6	0.9
Gram.	Andropogon	<i>Andropogon gayanus</i>	bout.	10000	2000	1160
Gram.	Brachiaria	<i>B. ruziziensis</i>	kg	8	1.6	0.9
Gram.	Dasho	<i>Pennisetum pedicelatum</i>	cut.	10000	2000	1160
Gram.	Herbe éléphant	<i>Pennisetum purpureum</i>	bout.	10000	2000	1160
Gram.	Oat	<i>Avena sativa</i>	kg	20	4	2.3
Gram.	Panicum	<i>Panicum maximum</i>	bout.	10000	2000	1160
Gram.	Pennisetum	<i>Pennisetum ruziziensis</i>	bout.	10000	2000	1160
Gram.	Sorgho	<i>Sorghum bicolor</i>	kg	8	1.6	0.9
Legum.	Alfafa	<i>Medicago sativa</i>	kg	8	1.6	0.9
Legum.	Alizicarpus	<i>Alizicarpus ovalifolia</i>	kg	6	1.2	0.7
Legum.	Cassia	<i>Chamaechrista rotundifolia</i>	kg	1	0.2	0.1
Legum.	Niébé	<i>Vigna unguiculata</i>	kg	10	2	1.2
Legum.	Crotalaria	<i>C. juncea</i>	kg	4	0.8	0.464
Legum.	Desmodium	<i>D. intortum, D. uncinatum</i>	kg	2	0.4	0.2
Legum.	Lablab	<i>Lablab purpureus</i>	kg	15	3	1.7
Legum.	Mucuna	<i>Mucuna pruriens</i>	kg	40	8	4.64
Legum.	Arachide perenne	<i>Neonotonia wightii</i>	kg	2	0.4	0.2
Legum.	Pois cajan	<i>Cajanus cajan</i>	kg	16	3.2	1.9
Legum.	Stylosanthes	<i>S. guianensis, S. hamata</i>	kg	6	1.2	0.7
Legum.	Vicia	<i>Vicia vilosa</i>	kg	80	16	9.3

Les animaux commencent à paître sur une des parcelles. Une fois que tout a été brouté, les animaux sont envoyés sur la parcelle suivante. La première parcelle est laissée sans pâturage jusqu'à ce que la végétation ait repoussé. Il ne faut pas envoyer les animaux sur une parcelle dont la végétation n'a pas entièrement repoussé. Il ne faut pas laisser trop longtemps les animaux sur une même parcelle pour éviter qu'ils ne tuent les plantes, particulièrement en saison sèche. Si aucune parcelle n'est propice à un certain moment, on laisse les animaux dans l'enclos et on les nourrit avec du fourrage pendant la période nécessaire. Il faut laisser les animaux suffisamment longtemps pour éviter une consommation sélective des espèces amenant à des problèmes d'enherbement et une prairie de mauvaise qualité. Régulièrement, on prélève les semences des différentes espèces. Après 3-4 ans, on resème les légumineuses sans travail du sol. Une fois la zone IV installée, les animaux peuvent également y paître selon le même principe.

**Divagation :** Les chèvres, moutons, vaches et poules se situent principalement dans leur étable et alternent entre les 4 champs de l'enclos. Quand une parcelle des zones I, II et IV est laissée en jachère, les animaux peuvent y paître, principalement dans l'agroforesterie (IV). Une semaine avant le semis d'une culture, les animaux sont envoyés sur la parcelle pour déparasiter, désherber, fertiliser et ameublir le sol. Ils se nourrissent de ce fait des restes de la culture précédente ou de l'engrais vert. En cas d'invasion de ravageurs, les poules sont envoyées sur la parcelle infectée, mais doivent être gardées sous surveillance car elles peuvent endommager les cultures. Les canards peuvent divaguer en tout temps sur la totalité de l'agroécosystème. Ils contribuent à lutter contre les ravageurs et n'endommagent que très peu les cultures.


**Nutrition :** En plus du pâturage mentionné ci-dessus, du fourrage est produit par le système. Les déchets de la cuisine sont donnés aux volailles et la production de paille et de feuilles (glicridia, sesbania, pois cajan, mucuna, patate douce, céréales, desmodium, brachiaria et haricot) aux chèvres et moutons. Une partie doit être séchée en foin pour nourrir les animaux en saison sèche. Les fruits du moringa, des arbres légumineux et les pois cajans sont donnés comme appoint énergétique et protéiné. Un supplément de maïs est envisageable. Pour les ruminants, l'apport de fourrage grossier se fait deux fois par jour, l'apport protéiné seulement le matin. Quand les animaux n'ont pas accès à des surfaces pour paître, du fourrage grossier doit être mis dans les mangeoires toute la journée. Les volailles sont nourries le matin avec les fruits légumineux, le soir avec les déchets de cuisine.

Les abreuvoirs doivent en permanence contenir de l'eau, les petits ruminants consommant 2-3 L d'eau par jour.

**Santé :** Des animaux de race robuste adaptés au climat local sont utilisés. Les animaux malades et les femelles fatiguées non portantes sont isolés, spécialement avant et après la mise bas. Du fourrage d'acacia (idéalement *A. raddiana*, *A. nilotica* et *A. karoo*) et de moringa (feuilles et graines) permettent de combattre les parasites gastriques (helminthes, nématodes) des chèvres et des moutons. Des pièges à mouche sont installés dans l'étable.

#### 7.4. Zone IV : agroforesterie

Des jeunes plants d'essence locale résistants à la sécheresse sont utilisés. Le reboisement se fait pendant la saison des pluies sur une parcelle de 1'000 m<sup>2</sup> où des arbres sont plantés dans des zones protégées par des clôtures grillagées. Une fois les arbres installés, on installe une rotation de cultures annuelles et une partie de la zone est utilisée pour le pâturage. Le système fournira de l'ombre aux animaux, du fourrage, du bois et des fruits. Il contribuera également à la création d'un microclimat positif.



Les arbres sont séparés en 3 catégories : grands arbres, arbres et buissons (voir tableau). Sur la surface de reboisement de 100 m x 10 m, il y a 2 lignes d'arbres avec un grand arbre sur 3 (voir schéma). Une rangée d'arbustes est plantée entre ces lignes. On alterne entre toutes les différentes espèces au sein des catégories. Après 4 à 5 ans, lorsque les arbres seront bien installés, il sera nécessaire d'éclaircir pour laisser plus de places aux grands arbres. Les arbres fruitiers reçoivent chacun 1.5 kg de fumier chaque année.

Les espèces suivantes peuvent être plantées :

Tableau 9 : Liste des arbres pouvant être plantés dans la zone IV. Taille : A = Arbre, B = Buisson, GA = Grand Arbre. Utilité : M = Médicinal, P = Phytosanitaire, Fo = Fourrage, Fr = Fruit, O = Ombre, Fe = Fertilisant, B = Bois, F = Feuilles.

Categorie	Nom commun	N. botanique	Utilité	Taille
Autre	Cailcédrat	<i>Khaya senegalensis</i>	B M	GA
Fruit	Manguier	<i>Mangifera indica</i>	Fr	GA
Legum.		<i>Acacia albida</i>	Fe Fo M O	GA
Autre	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	M P	A
Autre	Dattier du désert	<i>Balanites aegyptica</i>	Fo Fr	A
Fruit	Citronnier	<i>Citrus × limon</i>	Fr	A
Fruit	Grapefruit	<i>Citrus × paradisi</i>	Fr	A
Fruit	Orange	<i>Citrus × sinensis</i>	Fr	A
Fruit	Tangelo	<i>Citrus × tangelo</i>	Fr	A
Fruit	Mandarine	<i>Citrus reticulata</i>	Fr	A
Fruit	Goyavier	<i>Psidium guajava</i>	Fr M F O	A
Legum.		<i>Acacia nilotica</i>	Fe Fo M O	A
Legum.		<i>Acacia seyal</i>	Fe Fo M O	A
Legum.		<i>Gliricidia sepium</i>	Fe Fo S	A
Legum.		<i>Leucaena diversifolia</i>	Fe Fo E O	A
Fruit	Anarcadier	<i>Anacardium occidentale</i>	Fr	A
Fruit	Tamarinier	<i>Tamarindus indica</i>	Fr	A
Autre	Henza	<i>Boscia senegalensis</i>	Fo Fr M	B
Autre	Kinkeliba	<i>Combretum glutinosum</i>	Fo M	B
Autre		<i>Gmelina arborea</i>	Fo B	B
Autre		<i>Jatropha curcas</i>	Fu	B
Autre	Moringa	<i>Moringa oleifera</i>	Fo M Fr F	B
Legum.		<i>Calliandra calothyrsus</i>	Fe Fo E O	B
Legum.		<i>Prosopis glandulosa</i>	Fe Fo	B
Legum.		<i>Sesbania sesban</i>	Fe Fo E O	B

Après 4 à 5 ans, lorsque les arbres seront bien installés, il sera nécessaire d'éclaircir pour laisser plus de places aux grands arbres. On peut à ce moment aussi laisser pâturer les animaux aux pieds des arbres.

### 7.5. Zone V : bâtiments

Cette zone contient les bâtiments et les infrastructures nécessaires aux autres zones. Les neems doivent être plantés dans cette zone pour faire de l'ombre et avoir une source de biopesticide.

### 7.6. Zone VI : Haies vives productives

Les haies sont principalement composées d'arbres fourragers, médicinaux et tolérants à la sécheresse. Ils sont plantés en quinconce sur une double-ligne entourant toute la ferme. Les arbres sont plantés à 50 cm l'un de l'autre, il devrait donc y avoir 1600 arbres au total. Le désherbage et l'arrosage réguliers sont essentiels la première année seulement. Les arbustes sont taillés deux fois par an à une hauteur de 1,5 à 2 m. Les feuilles récoltées sont utilisées comme fourrage, tandis que les déchets ligneux sont transformés en biochar. Nous alternons les espèces en fonction de leur taille. Sur le bord extérieur, un cordon pierreux est creusé pour limiter l'érosion, et une clôture peut être construite pour protéger l'agroécosystème. Le tableau ci-dessous résume les espèces qui peuvent être plantées. Idéalement, plantez des arbres de toutes les espèces répertoriées.

Tableau 10 : Liste des arbres pouvant être plantés dans la haie. Taille : A = Arbre, B = Buisson, GA = Grand Arbre. Utilité : M = Médicinal, P = Phytosanitaire, Fo = Fourrage, Fr = Fruit, O = Ombre, Fe = Fertilisant, B = Bois, F = Feuilles.

Categorie	Nom commun	N. botanique	Utilité	Taille
Fruit	Anarcadier	<i>Anacardium occidentale</i>	Fr	A
Legum.		<i>Acacia nilotica</i>	Fe Fo M O	A
Legum.		<i>Acacia seyal</i>	Fe Fo M O	A
Legum.		<i>Gliricidia sepium</i>	Fe Fo O	A
Legum.		<i>Leucaena diversifolia</i>	Fe Fo Fu O	A
Autre	Neem	<i>Azadirachta indica</i>	M P	A
Autre	Dattier du désert	<i>Balanites aegyptica</i>	Fo Fr	A
Legum.		<i>Calliandra calothyrsus</i>	Fe Fo Fu O	B
Legum.		<i>Prosopis glandulosa</i>	Fe Fo	B
Legum.		<i>Sesbania sesban</i>	Fe Fo Fu O	B
Autre	Henza	<i>Boscia senegalensis</i>	Fo Fr M	B
Autre	Kinkeliba	<i>Combretum glutinosum</i>	Fo M	B
Autre		<i>Gmelina arborea</i>	Fo B	B
Autre		<i>Jatropha curcas</i>	Fu	B
Autre	Moringa	<i>Moringa oleifera</i>	Fo M Fr F	B
Legum.		<i>Acacia albida</i>	Fe Fo M O	GA
Autre	Cailcédrat	<i>Khaya senegalensis</i>	B M	GA